

LEGUMINOSE

SPECIE		DURATA	UTILIZZO								DESTINAZIONE D'USO		SEMINA			TOLLERANZE			CARATTERISTICHE	
			Durata	Erbaio	Utilizzo in purezza	Prato stabile	Sovescio	Apistico	Cover	Fieno	Insilato	Pascolo	Epoca	Kg/ha in purezza	Freddo	Siccità	Ristagni	Peculiarità	Limiti	
TRIFOGLIO INCARNATO	<i>Tr. incarnatum</i>	6-8 mesi	●●●●	●●	●	●●●●●	●●	●	●●	●●● (Y)	●●●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	25	●●●●	●	●●	Precoce competitiva no meteorismo, pascolo invernale ottimo per erbai con graminacee.	Sensibile al secco, semina primaverile 1 solo sfalcio.		
TRIFOGLIO ALESSANDRINO	<i>Tr. alexandrinum</i>	6-8 mesi	●●●●	●●	●	●●●	●●	●	●●●	●● (Y)	●●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	20-25	●●	●●●	Aggressivo adatto a semina primaverile, più sfalci.	Sensibile al freddo.			
TRIFOGLIO SQUARROSO	<i>Tr. squarrosum</i>	6-8 mesi	●●●	●●	●	●●●●●	●●	●	●●●●	●● (Y)	●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	25-30	●●	●●	Inseadimento rapido, produzione elevata.	1 solo taglio patisce le gelate, grossolano se sfalcio in ritardo.			
TRIFOGLIO PERSIANO	<i>Tr. resupinatum</i>	6-8 mesi	●●●●	●●	●	●●●●	●●●●	●	●●●●	●● (Y)	●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	15-20	●●	●●	Rapido, adatto suoli pesanti molto attrattivo per le api.	Non molto gradito agli animali al pascolo.			
TRIFOGLIO SOTTERRANEO	<i>Trifolium subterraneum L.</i>	6-9 mesi (autorseminante)	●	●	●●	●●●	●●●	●●	●	-	●	Settembre/Ottobre	25-30	●	●●●	Auto riseminante in estate muore ma riparte in autunno.	Poco produttivo per uso zootecnico.			
TRIFOGLIO MICHELIANO	<i>Trifolium michelianum</i>	6-8 mesi (autorseminante)	●	●	●	●●●	●●●	●●	-	-	-	Settembre/Ottobre	8-10	●●	●●●	Sopporta bene terreni "difficili": idromorfi e salini. Autoriseminante.	Predilige gli ambienti mediterranei.			
TRIFOGLIO BIANCO	<i>Trifolium repens</i>	4-5 anni	●●●	●●	●●●	●	●●●	-	●●	●	●●●●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	10-15	●●●●	●●	●	Portamento rizomatoso => tolleranza al pascolamento, calpestamento, durata e effetto antierosivo, appetibile.	Non adatto a stress idrico e calorico.		
TRIFOGLIO BIANCO/LADINO	<i>Trifolium repens var. giganteum</i>	4-5 anni	●●●	●●●●	●●●●●	●	●●	-	●●●●●	●●●	●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	10-15	●●●●	●	●	Eccelenti prati monofiti, fino a 8 sfalci in irriguo.	Non adatto a stress idrico e calorico.		
TRIFOGLIO VIOLETTO/PRALENSE	<i>Trifolium pratense</i>	2-4 anni	●	●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●	●●●●	●●●	●●●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	20-25	●●●●	●●	●●●	Produttiva, tollera freddo, con valore nutrizionale.	Durata limitata e basse produzioni al primo anno.		
VECCIA COMUNE	<i>Vicia sativa</i>	6-9 mesi	●●●●●	●●	●	●●●●●	●●	●●●	●●●●	●●●●● (Y)	●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	80-100	●●●	●●	●	Molto versatile e utilizzata erbai, apporto proteico.	Sensibile ristagni.		
VECCIA VILLOSA	<i>Vicia villosa</i>	6-9 mesi	●●●●	●	●	●●●●	●●	●	●●●●	●●●●● (Y)	●●●●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	45-60	●●●●	●●●	●●●	Pascolabile in inverno con rapido ricaccio, molto rustica.	Aggressiva negli erbai.		
GINESTRINO	<i>Lotus corniculatus L.</i>	2-4 anni	●	●●●	●●●●	●	●●●●	●	●●●●	●●	●●●	Marzo/Aprile (Autunnale)	15-20	●●●	●●●●●	●●●	Adattabile a tutti i terreni, tollera secco, flessibile.	Poco aggressiva 1° anno, produzione media.		
LUPINELLA	<i>Onobrychis viciifolia</i>	2-3 anni	●	●●●	●●●●	●	●●●●	●	●●●●	●	●●	Marzo/Aprile (Autunn. sud)	35-40	●●●	●●●●	●	Tollera secco, valorizza terreni marginali.	Sensibile calpestio, buona resa solo 1° taglio.		
FIENO GRECO/TRIGONELLA	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	6-9 mesi	●●●	●(●●)	-	●●●	●●●	●●●	●●	●	-	15-30 Ottobre Febbr./Marzo	35-40	●(●)	●●●	●	Elevata tolleranza secco, utilizzabile come sovescio erbaio a semina fine inverno. Uso granella cosmesi.	Sensibile freddo (-10°).		
MELILOTO BIANCO/GIALLO	<i>Melilotus alba/Officinalis</i>	1-2 anni	●	●	●●	●●	●●●●	●	●	-	-	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	20-25	●●●	●●●	●●	Ottima mellifera per lunga fioritura.	Potenzialmente tossica per animali (cumarina anticoagulante).		
SULLA	<i>Hedysarium coronarium</i>	1-2 anni	●	●●●●	●	●●●	●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	Marzo/Aprile (Autunnale sud)	20-30	●	●●●●	●●	Ottima per rotazione colturale.	Teme il freddo e l'acidità.		
FAVINO	<i>Vicia faba minor</i>	6-9 mesi	●●●●●	●●●●	-	●●●●	●●●	●●●	●●	●●● (Y)	●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	140-150	●●	●●	●●	Monostelo ed eretta, eccellente per miscugli foraggeri o bioenergetici e sovesci.	Attenzione a freddo e siccità.		
LUPINO	<i>Lupinus albus</i>	7-9 mesi	●●	●●●●	-	●●●●	●●●●	●●	●	●●	●	Settembre/Ottobre Marzo/Aprile	125-150	●●●●	●●●	●●	Adatto a terreni marginali e acidi, capace di solubilizzare fosforo.	Presenza alcaloidi amari nella granella (meno nel L.albus).		
PISELLO FORAGGERO	<i>Pisum sativum var. arvensis</i>	7-9 mesi	●●●●	●●●●●	-	●●●●	●●	●●●	●●●	●●● (Y)	●	Ottobre/Novembre Febb/Aprile	80-110	●●●(●)	●	●●	Ottimo per erbai e sovesci. Più foglioso di pisello proteico.	Patisce caldo e siccità tardo-primaverile.		
CROTALARIA	<i>Crotalaria juncea</i>	4-6 mesi	-	●●●●	-	●●●●●	●●●●	●	-	-	-	Maggio/Agosto	25-30	●	●●●	●●	Pianta da sovescio miglioratrice e rinettante, notevole apporto N azione fumigante.	Tropicale: non sopporta freddo, no alimentazione animale.		
VIGNA	<i>Vigna sinensis (unguiculata)</i>	5-7 mesi	●●●●	●●●	-	●●●●	●●●	●●●	●●	●●●	-	Maggio/Luglio	30-60 Kg	●	●●●●	●●	Ottimo per erbaio e sovescio estivo, per apporto proteine/azoto e s.s.	Freddo no pascolo e foraggio verde.		

